

Titus®

Herbicida sistémico

Tipo de produto: Herbicida

Composição: Grânulos dispersíveis
em água (WG) c/ 25% (p/p) de rinsulfurão

Família química: Sulfonilureias

Número de AV: 0612

Classificação ADR: 3077, 9, III

Titus®



Embalagem: 100 g



ATENÇÃO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- ⊕ **TITUS®** é um herbicida sistémico com reduzida ação residual.
- ⊕ O produto é absorvido foliarmente e transportado até aos tecidos meristemáticos, onde irá atuar.
- ⊕ **TITUS®** é indicado para o controlo de infestantes gramíneas e algumas dicotiledóneas, em **pós-emergência**.

INFESTANTES SUSCETÍVEIS

Aveia-louca (*Avena fatua*), Azevéns (*Lolium spp.*), Bredo (*Amaranthus blitoides*), Grizandra (*Diploaxis erucoides*), Malvão (*Abutilon theophrasti*), Margaça-das-boticas (*Matricaria chamomilla*), Milhã-digita-da (*Digitaria sanguinalis*), Milhã-pé-de-galo (*Echinochloa crus-galli*), Milhã-verde (*Setaria viridis*), Milhã-verticilata (*Setaria verticillata*), Milho-alvo (*Panicum dichotomiflorum*), Moncus-de-Perú (*Amaranthus retroflexus*), Morrião (*Anagalis arvensis*), Morugem-branca (*Stellaria media*), Serralha-macia (*Sonchus oleraceus*).

INFESTANTES MODERADAMENTE SUSCETÍVEIS

Beldroega (*Portulaca oleracea*), Erva-moleirinha (*Fumaria officinalis*), Erva-pessequeira (*Polygonum persicaria*).

INFESTANTES RESISTENTES

Catassol (*Chenopodium album*), Erva-moira (*Solanum nigrum*), Mal-casada (*Polygonum lapathifolium*), Sempre-noiva (*Polygonum aviculare*), Urtiga-morta (*Mercurialis annua*).



SAPEC
AGRO PORTUGAL

ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

CULTURA	DOSE g/ha	RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO
Batateira	50-60	A aplicação deve ser feita até que a cultura atinja os 25cm, aproximadamente quando se dá a cobertura dos camalhões, e quando as infestantes se encontrarem no estado de 1-3 folhas.
Milho		A aplicação deve ser feita até às 8 folhas da cultura, quando as infestantes se encontrarem no estado de 1-3 folhas (gramíneas) e 2-4 folhas (dicotiledóneas).
Tomate		Efetuar a aplicação após vencida a crise de transplantação.

OBSERVAÇÕES

- + Para melhorar a eficácia do **TITUS®** adicionar o **TREND® 90** a 0,1% pois facilita a absorção e penetração do produto através da cutícula das folhas.
- + Os sintomas visíveis aparecem ao fim de 15-20 dias após a aplicação.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- + A aplicação única de 50-60 g/ha pode ser substituída por 2 aplicações: 1ª - 40 g/ha e 2 semanas depois a 2ª aplicação - 30 g/ha.
- + Evitar utilizar **TITUS®** em milho doce ou em campos de multiplicação.
- + O **TITUS®** não deve ser usado em campos de milho ou de tomate previamente tratados com inseticidas organofosforados sistémicos, nem com estes deve ser efetuada qualquer mistura.
- + Recomenda-se não efetuar qualquer rega até 72 horas depois da aplicação do **TITUS®**.
- + Evitar as misturas de **TITUS®** com herbicidas que tenham na sua composição bentazona ou 2,4-D.
- + Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto.
- + Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura.



Milhã



Saramago



Malvão