

Herbofital® Combi

Herbicida sistémico

Tipo de produto: Herbicida

Composição: Solução concentrada (SL) contendo 345 g/L ou 28,8% (p/p) de 2,4-D (na forma de sal de dimetilamónio) e 345 g/L ou 28,8% (p/p) de MCPA (na forma de sal de dimetilamónio).

Família química: Ácidos ariloxialcanóicos

Número de AV: 0639

Classificação ADR: 3082, 9, III



Embalagem: 1 L e 20 L



PERIGO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- ⊕ **HERBOFITAL® COMBI** é um herbicida sistémico e seletivo.
- ⊕ O produto é absorvido pelas folhas e desloca-se no interior da planta até aos órgãos subterrâneos.
- ⊕ **HERBOFITAL® COMBI** é indicado para o controlo das infestantes de folha larga, na cultura do trigo, cevada, centeio e prados permanentes de gramíneas e trevos.

INFESTANTES SUSCETÍVEIS

Cardo-das-vinhas (*Cirsium arvense*), corriola (*Convolvulus arvensis*), ervilhaca-vulgar (*Vicia sativa*), papoila-das-searas (*Papaver rhoeas*) e saramago (*Raphanus raphanistrum*).

INFESTANTES RESISTENTES

Gramíneas em geral e ainda as dicotiledóneas: bolsa-de-pastor (*Capsella rubela*), margaça (*Chamaemelum mixtum*), margaça-de-inverno (*Chamaemelum fuscum*), margação (*Anthemis arvensis*), pampilho-das-searas (*Chrysanthemum segetum*) e pampilho-de-micão (*Coleostephus myconis*).




SAPEC
AGRO PORTUGAL

ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

CULTURA	DOSE L/ha	RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO
Prados Permanentes	Gramíneas 1,9-2,4 Trevo Branco 0,6-1,0	Aplicar no fim do Inverno, princípio da Primavera, quando a vegetação é reduzida ou, no fim do Verão, cerca de 10 dias após o corte ou pascigo. Não se recomenda para prados temporários de leguminosas além de trevo branco. Aguardar pelo menos 3 semanas entre o tratamento e o corte da forragem.
Trigo, Cevada e Centeio	0,75-1,5	Aplicar desde o fim do afilhamento até ao fim do encanamento do cereal e quando as infestantes estão em crescimento ativo.

OBSERVAÇÕES

- + O **HERBOFITAL® COMBI** tem uma ação lenta, à semelhança dos restantes herbicidas hormonais, mas provoca um desenvolvimento muito rápido da parte aérea que não é acompanhado pelo sistema radicular, levando à morte da infestante.
- + Os primeiros sintomas (distorções nos caules e folhas e posterior necrosamento) aparecerão, sensivelmente, 7 dias após a aplicação. A morte total da infestante decorrerá no prazo de 1 mês.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- + Tratar em períodos de ativo crescimento das infestantes.
- + Tratar com o tempo calmo e temperaturas entre 10°C e 25°C.
- + São necessárias 5 horas para o produto ser absorvido.
- + Não aplicar perto de culturas suscetíveis como: batateira, tomateiro, meloeiro, algodoeiro, flores, vinha, pomares, faveira, gramicha e outras leguminosas.
- + Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto.
- + Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura.



Cardo-
das-
vinhas



Corriola



Papoila-
das-
searas