

Corsário®

**Inseticida sistémico
de alta eficácia**

Tipo de produto: Inseticida

Composição: Solução concentrada com 200 g/L
ou 17,8% (p/p) de imidaclopride

Família química: Cloronicotínico

Número de APV: 3738

Classificação ADR: Isento

Embalagem: 50 mL, 1 L e 5 L



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- + **CORSÁRIO®** é um inseticida sistémico, especialmente eficaz sobre insetos picadores-sugadores (afídeos, moscas brancas, cicadelídeos), escaravelho da batateira e lagartas mineiras da macieira e citrinos.
- + **CORSÁRIO®** atua por contato e ingestão.
- + Alia um elevado efeito de choque a uma boa persistência de ação.

OBSERVAÇÕES

- + O **CORSÁRIO®** tem um modo de ação diferente dos inseticidas neurotóxicos tradicionais - organofosforados, carbamatos e piretróides - pelo que controla populações de pragas que tenham adquirido resistência. Isto torna-o especialmente indicado não só para situações de populações resistentes, como também para integrar esquemas de alternância de s.a.'s para prevenir o seu aparecimento.
- + A forte ação sistémica ascendente do imidaclopride, permite-lhe proteger os rebentos em crescimento, incluindo os tecidos que se formam depois da aplicação.
- + Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto.
- + Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura.



ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

CULTURA	PRAGA	CONC. mL/hL	DOSE L/ha	RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO	IS
Batareira	Escaravelho	75	0,75	Aplicar ao aparecimento da praga. Repetir em caso de necessidade.	21 dias
Cerejeira	Afídeos	50	0,5		
Citrios	Mosca Branca	75* ou 50	0,75 0,5	A 1ª aplicação deve ser feita no início do ataque, após a eclosão dos ovos. Em caso de necessidade, repetir a aplicação 21 dias depois.	14 dias
	Mineira das folhas dos rebentos	50**	0,5	A 1ª aplicação deve ser feita no início do ataque, quando os 1ºs rebentos começam a ter as 1ªs folhas. Os tratamentos seguintes devem ser feitos a intervalos de 14 a 21 dias, consoante a intensidade do ataque, tendo em atenção proteger eficazmente as folhas mais jovens.	14 dias
Macieira	Mineiras e Afídeos	50	0,5	Aplicar ao aparecimento da praga. Repetir em caso de necessidade.	14 dias
Pereira	Afídeos	50	0,5		
Pessegueiro					
Tomateiro Meloeiro Pimenteiro	Afídeos	50	0,5		3 dias
Tomateiro Pimenteiro	Mosca branca	50	0,5		14 dias
Tabaco	Afídeos	50	0,5		
Vinha	Cicadela ou Cigarrinha verde	35	0,35	A aplicação deve ser feita quando se encontrarem 100 larvas em 100 folhas e a partir de julho quando houver 50 larvas em 100 folhas.	14 dias

* adicionar 1L/hL de FITANOL® ** adicionar 0,5 L/hL de FITANOL®

ALARGAMENTO DE ESPECTRO PARA USOS MENORES

CULTURA	PROBLEMA	CONC. mL/hL	IS
Vinha	Cigarrinha/Cicadelideo da flavescência dourada	35	14 dias

OBSERVAÇÕES

- ⊕ A eficácia e a eventual fitotoxicidade resultantes destas utilizações menores são da inteira responsabilidade do utilizador do produto fitofarmacêutico.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- ⊕ Quando se realizam tratamentos em Citrios ter sempre em atenção as recomendações para a utilização de FITANOL®: regar antes da aplicação e não aplicar desde a floração até os frutos terem tamanho de uma noz.
- ⊕ O **CORSÁRIO®** é perigoso para abelhas, pelo que não se deve aplicar este produto durante a floração das culturas. Não aplicar em limoeiros.



EscaravELHO
batateira



Cicadela
vinha



Afídeos
macieira