

Trinco

**Herbicida de contacto,
sistémico e residual**

Tipo de produto: Herbicida

Composição: Suspensão concentrada com
400 g/L ou 35,3% (p/p) de clortolurão e
25 g/L ou 2,2% (p/p) de diflufenicão

Família química: Ureia e nicotinilidas

Número de APV: 3787

Classificação ADR: 3082, 9, III



Embalagem: 5 L



ATENÇÃO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS


- + **TRINCO** é um herbicida com tripla ação: contacto, sistémico e anti-germinativo ou residual.
- + O produto é absorvido pelas folhas e pelas raízes das infestantes.
- + **TRINCO** é seletivo para a cultura da cevada e do trigo e é indicado para o controlo de infestantes anuais em pré e/ou pós-emergência.

INFESTANTES SUSCETÍVEIS

Cabelo-de-cão (*Poa annua*), erva-febra (*Lolium rigidum*), esparguta (*Spergula arvensis*), morugem-branca (*Stellaria media*), mostardas (*Sinapis* spp.), pampilho-das-searas (*Chrysanthemum segetum*), papoila-das-searas (*Papaver rhoeas*), saramago (*Raphanus raphanistrum*), *Spergularia rubra*.

INFESTANTES RESISTENTES

Agulha-de-pastor (*Scandix pecten veneris*), corriola (*Convolvulus arvensis*), fumarias (*Fumaria* spp.).



ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

CULTURA	DOSE L/ha	RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO
Cevada	3,5	Aplicação em pós-emergência com o cereal desde as 3 folhas até ao meio do afilhamento. As infestantes dicotiledóneas não devem ter mais de 2-4 folhas e as gramíneas deverão estar no início do afilhamento.
Trigo Duro	2,5	Aplicar em pré-emergência da cultura.
Trigo Mole	3,5-4	Aplicação em pré ou pós-emergência . A aplicação em pós-emergência deve ser feita com o cereal desde as 3 folhas até ao meio do afilhamento. As infestantes dicotiledóneas não devem ter mais de 2-4 folhas e as gramíneas deverão estar no início do afilhamento.

OBSERVAÇÕES

- ⊕ A aplicação de **TRINCO** em pré-emergência deve ser feita nas seguintes condições:
 - Solo bem preparado, liso, sem torrões e com humidade;
 - Não mobilizar o solo após a aplicação do produto;
 - Não tratar os cereais na altura da emergência (entre o estado de coleóptilo e 1-2 folhas).

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- ⊕ Durante a aplicação não atingir terrenos ou culturas vizinhas.
- ⊕ Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto.
- ⊕ Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura.



Cabelo-de-cão



Pampilho-das-searas



Saramago