

# Nico M<sup>®</sup>

Herbicida sistémico



**Tipo de produto:** Herbicida

**Composição:** Dispersão em óleo com 40 g/L ou 4,3 % (p/p) de nicossulfurão

**Família química:** Sulfonilureias

**Número de APV:** 3809

**Classificação ADR:** 3082, 9, III



**Embalagem:** 1 L e 5 L



ATENÇÃO

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- + **NICO M<sup>®</sup>** é um herbicida sistémico para o controlo de infestantes anuais, na cultura do milho, numa estratégia de pós-emergência.
- + O produto é absorvido, principalmente, pelas folhas e também, em menor escala, pelas raízes, sendo transportado até aos tecidos de crescimento da planta, onde irá exercer a sua ação.
- + **NICO M<sup>®</sup>** é um produto seletivo para o milho.

## INFESTANTES SUSCETÍVEIS

Bredos (*Amaranthus* spp.), cabelo-de-cão (*Poa annua*), milhã-pé-de-galo (*Echinochloa crus-galli*), saramago (*Raphanus raphanistrum*) e setarias (*Setaria viridis*, *Setaria verticillata*, *Setaria pumila*).

## INFESTANTES RESISTENTES

*Chenopodium* spp., erva-moira (*Solanum nigrum*), figueira-do-inferno (*Datura stramonium*), junças (*Cyperus* spp.), *Polygonum* spp.. Sempre que haja grandes infestações de *Chenopodium* spp., *Datura stramonium*, *Solanum nigrum* ou outras infestantes dicotiledóneas, deve-se misturar o herbicida ASTECA<sup>®</sup> MAYS na dose de 3 L/ha.



  
**SAPEC**  
AGRO PORTUGAL

## ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

CULTURA	DOSE L/ha	RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO
Milho	1-1,5	Aplicar quando o milho apresentar 5-6 folhas e as infestantes 3-5 folhas.

## OBSERVAÇÕES

- + Os efeitos da aplicação do **NICO M<sup>®</sup>** são visíveis 15-20 dias após aplicação.
- + Em infestações de sorgo-bravo o produto tem uma performance muito interessante.

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- + Não misturar com adubos líquidos.
- + Não aplicar com temperaturas acima dos 25° C (sobretudo se a cultura apresentar stress hídrico) ou inferiores a 10° C.
- + A aplicação repetida do herbicida ou de herbicidas com o mesmo modo de ação pode provocar o desenvolvimento de biótopos resistentes de algumas infestantes indicadas no rótulo como suscetíveis.
- + Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto.
- + Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura.



Milhãs



Bredos



Cabelo-de-cão