

Eky[®] Trio Azul

Fungicida anti-míldio
sistémico triplo

Tipo de produto: Fungicida

Composição: Pó molhável com 4,8 % (p/p)
de cimoxanil + 40 % (p/p) de folpete +
8 % (p/p) metalaxil

Família química: Acetamida, N-tiotrihalometilo
(ftalimida) e fenilamida

Número de APV: 3887

Classificação ADR: 3077, 9, III



Embalagem: 250 g e 5 kg



ATENÇÃO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- ⊕ **EKY[®] TRIO AZUL** é um fungicida sistémico, com ação preventiva, curativa e erradicante para o controlo do míldio da videira e batateira. Apresenta três s.a. na sua composição, que lhe conferem um triplo modo de ação: contacto – folpete; penetrante – cimoxanil; sistémico – metalaxil.
- ⊕ **EKY[®] TRIO AZUL** pela sua tripla composição apresenta maior eficácia biológica média, maior uniformidade no controlo da doença e menor risco de desenvolvimento de estirpes resistentes.
- ⊕ Assegura uma proteção eficaz dos novos lançamentos formados entre dois tratamentos, com uma elevada persistência de ação – 12 a 14 dias.

OBSERVAÇÕES

- ⊕ O **EKY[®] TRIO AZUL** é o único fungicida triplo à base de fenilamidas, o que lhe confere a manutenção de eficácias elevadas em situações onde se verificam quebras de eficácia àquele grupo de fungicidas.
- ⊕ Recomenda-se a aplicação de **EKY[®] TRIO AZUL** em situações de elevado risco de ocorrência da doença, como sejam o crescimento ativo da videira, a floração e a deteção da presença e pressão do míldio na região em causa.




SAPEC
AGRO PORTUGAL

ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

CULTURA	PROBLEMA	CONC. g/hL	DOSE kg/ha	RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO	IS
Bataeira	Míldio	250	2,5	Aplicar o EKYP® TRIO AZUL no período de crescimento ativo da cultura, molhando muito bem toda a parte vegetativa. Os tratamentos devem ser efetuados a intervalos de 12 dias. Caso existam chuvas constantes e alta pressão da doença, reduzir o intervalo entre aplicações para 10 dias.	14 dias
Videira				Em condições favoráveis ao míldio, entre o estado de 7-8 folhas e o estado de "bago grão de chumbo", a persistência biológica do produto é de 12 a 14 dias.	42 dias*

* Em videira de uvas para vinificação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


- + Seguir as recomendações dos Serviços de Avisos.
- + Não efetuar mais de 2 tratamentos com este ou outro fungicida do grupo das fenilamidas.
- + **EKYP® TRIO AZUL** não afeta a fermentação nem as características organolépticas dos vinhos.
- + As concentrações indicadas referem-se a pulverizações em alto volume. Quando a aplicação se faz com aparelhos de médio ou baixo volume (turbinas ou atomizadores), a concentração deve ser aumentada por forma a que a dose de produto por hectare seja a mesma que no alto volume.
- + Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto.
- + Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura.



Míldio videira



Míldio videira



Míldio bataeira