

Danadim® Progress

Inseticida sistémico

Tipo de produto: Inseticida

Composição: Concentrado para emulsão (EC)

c/ 37,7% (p/p) ou 400 g/L de dimetoato

Família química: Organofosforado

Número de AV: 0490

Classificação ADR: 1993, 3, III

Embalagem: 100 mL, 1 L e 20 L



ATENÇÃO

Advertências de perigo: H226, H302, H317, H332, H411

Recomendações de prudência: P210, P261, P270, P280, P333+P313, P362+P364, P391, P501

Informações suplementares: RPT1, SPo5, SPoPT4, SPoPT5, SPoPT6, SPoPT7+SPoPT2, SP1, SPe3, SPe8

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- + **DANADIM® PROGRESS** é um inseticida sistémico de largo espectro de ação.
- + **DANADIM® PROGRESS** atua por contacto e ingestão.
- + Possui um bom efeito de choque e boa persistência de ação.
- + Por ser sistémico, apresenta boa resistência à lavagem pela chuva.

OBSERVAÇÕES

- + A sua ação sistémica, permite-lhe controlar pragas de difícil acesso, nomeadamente quando se verifique enrolamento de folhas.
- + É um larvicida, pelo que de um modo geral, deve ser aplicado logo que se detetem as formas móveis (larvas/ninfas) dos insetos.
- + Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto.
- + Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura.



ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

CULTURA	PRAGA	CONC. mL/hL	DOSE L/ha	RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO	IS
Cenoura Pastinaca Raiz de Salsa	Mosca da Cenoura	-	0,6	Aplicar no início da infestação. Número máximo de tratamentos: 3 Intervalo entre tratamentos: 7 dias.	35 dias
Cereais (Trigo, Centeio e Tríticale)	Afídeos	-	0,4 - 0,5	Aplicar no início da infestação. Aplicar só até ao fim da floração. Utilizar a dose mais alta em situações de elevada pressão da praga não efetuando mais do que 1 tratamento.	-
Citrinos (Laranja, limão, tangerina e toranja)	Afídeos	100 - 120	1,2	Aplicar no início da infestação. Utilizar a dose mais alta em situações de elevada pressão da praga. Número máximo de tratamentos: 2	120 dias
Oliveira	Traça da oliveira	120	1,2	Aplicar no início da infestação não efetuando mais do que 1 tratamento.	28 dias
	Mosca da azeitona	100	1,2	Aplicar no início da infestação não efetuando mais do que 1 tratamento. Utilizar um volume de calda de 1.200L.	
Cebola Alho Chalota	Tripos	-	0,5 - 0,6	Aplicar no início da infestação. Utilizar a dose mais alta em situações de elevada pressão da praga. Número máximo de tratamentos: 2 Intervalo entre tratamentos: 10 dias.	14 dias
Beterraba (mesa) Nabo	Afídeos			Aplicar no início da infestação. Utilizar a dose mais alta em situações de elevada pressão da praga. Número máximo de tratamentos: 2 Intervalo entre tratamentos: 21 dias.	28 dias
Beterraba sacarina	Afídeos			Aplicar no início da infestação. Utilizar a dose mais alta em situações de elevada pressão da praga. Número máximo de tratamentos: 2 Intervalo entre tratamentos: 21 dias.	
Tomateiro Beringela	Afídeos			Aplicar no início da infestação. Utilizar a dose mais alta em situações de elevada pressão da praga. Número máximo de tratamentos: 2 Intervalo entre tratamentos: 14 dias.	21 dias
Ornamentais (ar livre e estufa)	Afídeos	-	0,6	Aplicar no início da infestação. Aplicar só até ao início da floração. Número máximo de tratamentos: 2 Intervalo entre tratamentos: 7 dias	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- ⊕ O **DANADIM® PROGRESS** é perigoso para abelhas, pelo que não se devem realizar aplicações durante a floração.



Mosca
oliveira



Mosca
oliveira



Afídeos
cereais