

# Kapital Trio®

Herbicida residual, sistémico  
e de contacto



**Tipo de produto:** Herbicida

**Composição:** Suspensão concentrada com 50 g/L ou 4,2% (p/p) de diflufenicão, 200 g/L ou 18,3% (p/p) de glifosato (sob a forma de sal de isopropilamónio) e 30 g/L ou 2,7% (p/p) de oxifluorfena

**Família química:** Nicotinamilidas, aminoácido e difeniléter

**Número de APV:** 3925

**Classificação ADR:** 3082, 9, III



**Embalagem:** 5 L



ATENÇÃO

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- ⊕ **KAPITAL TRIO®** é um herbicida com ação tripla: sistémico, residual e de contacto.
- ⊕ O produto é absorvido pelas folhas e pelas raízes das infestantes.
- ⊕ **KAPITAL TRIO®** reúne as melhores características das 3 moléculas que o compõem:
  - glifosato – elimina as infestantes já presentes no terreno
  - oxifluorfena – efeito sinérgico muito importante com o glifosato; nesta mistura sobressai o efeito de contacto desta molécula (assim eliminamos infestantes mais difíceis e maiores, já presentes no terreno)
  - diflufenicão – persistência de ação elevada

## OBSERVAÇÕES

- ⊕ Deve-se aplicar **KAPITAL TRIO®** no máximo até, pelo menos, 1 mês antes do abrolhamento da cultura de forma a evitar que o produto se acumule nas escamas dos gomos e possa comprometer o correto desenvolvimento da planta.



  
**SAPEC**  
AGRO PORTUGAL

ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

CULTURA	DOSE L/ha	RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO
Macieira e Pereira	5	Aplicar em pós-emergência das infestantes, durante o repouso vegetativo ou após o vingamento dos frutos.
Oliveira		Aplicar após a emergência das infestantes, no fim do Outono ou Primavera. A aplicação deve ser dirigida ao solo, de modo a não atingir as partes verdes da cultura.
Vinha		Aplicar em pós-emergência das infestantes, durante o período de repouso vegetativo até cerca de 1 mês antes do abrolhamento da cultura.

INTERVALO DE SEGURANÇA - 28 dias em macieira, pereira; em oliveira não aplicar após o início da queda das azeitonas.

INFESTANTES SUSCETÍVEIS

Amor-de-hortelão (*Galium aparine*), balanco (*Avena sterilis*), beldroega (*Portulaca oleracea*), bredos (*Amaranthus* spp.), cabelo-de-cão (*Poa annua*), catassol (*Chenopodium album*), erva-febra (*Lolium rigidum*), erva-moleirinha (*Fumaria officinalis*), erva-pata (*Oxalis pes-caprae*), erva-pessegueira (*Polygonum persicaria*), erva-vaqueira (*Calendula arvensis*), ervilhacas (*Vicia* spp.), esparguta (*Spergula arvensis*), Geranium spp., grizanda (*Diploaxis catholica*), lâmio (*Lamium amplexicaule*), margaças (*Chamaemelum* spp.), morrião (*Anagallis arvensis*), morugem-branca (*Stellaria media*), mostarda-dos-campos (*Sinapis arvensis*), nariz-de-zorra (*Silene gallica*), pampilho-das-searas (*Chrysanthemum segetum*), ranúnculos (*Ranunculus* spp.), raspa-saias (*Picris echioides*), salsinha (*Torilis nodosa*), saramago (*Raphanus raphanistrum*), sempre-noiva (*Polygonum aviculare*), serralha-macia (*Sonchus oleraceus*), soagem (*Echium plantagineum*), tasneirinha (*Senecium vulgaris*) e urtiga-dioica (*Urtica dioica*).

INFESTANTES RESISTENTES

Agulheira-moscada (*Erodium moschatum*), alho-das-vinhas (*Allium vineale*), bons-dias (*Convolvulus tricolor*), candeias (*Arisarum vulgare*), cardo-das-vinhas (*Cirsium arvense*), corriola (*Convolvulus arvensis*), escalracho (*Panicum repens*), graminhão (*Paspalum paspalodes*), jarro-dos-campos (*Arum italicium*), junças (*Cyperus* spp.), malvas (*Malva* spp.), maria-fia (*Erodium malacoides*) e pinheirinha (*Equisetum ramosissimum*).

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- + Durante a aplicação, não atingir os terrenos e culturas vizinhas.
- + Não aplicar em vinhas, pomares e olivais com menos de 3 anos.
- + Durante a aplicação não atingir as partes verdes da cultura nem feridas de poda recentes (com menos de 15 dias).
- + Não aplicar quando se prevê chuva nas 6 horas seguintes à aplicação.
- + A aplicação repetida de **KAPITAL TRIO®** ou de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação pode provocar o desenvolvimento de biótipos resistentes de algumas infestantes indicadas no rótulo como suscetíveis. Recomenda-se não aplicar **KAPITAL TRIO®** mais do que 3 anos consecutivos nos mesmos solos. De preferência, proceder à alternância com outros herbicidas de diferente mecanismo de ação.
- + Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto.
- + Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura.



Cabelo-de-cão



Erva-febra



Serralha-macia