

# Cuprital® SC

Fungicida cúprico líquido

**Tipo de produto:** Fungicida

**Composição:** Suspensão concentrada (SC)

c/ 38% (p/p) ou 700 g/L de cobre  
(sob a forma de oxicloreto de cobre)

**Família química:** Inorgânico

**Número de APV:** 3995

**Classificação ADR:** 3082, 9, III

**Embalagem:** 5L e 10 L



**ATENÇÃO**

**Advertências de perigo:** H332, H410

**Recomendações de prudência:** P101, P261, P270, P280, P304+P341, P501

**Informações suplementares:** EUH210, SP1, SPe3a, SPPT1

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- ➕ **CUPRITAL® SC** é um fungicida/bactericida com ação preventiva, indicado para o controlo de diversas doenças.
- ➕ **CUPRITAL® SC** apresenta partículas com dimensão reduzida e uniforme:
  - Maior superfície específica – Maior poder protetor;
  - Melhor aderência aos tecidos vegetais;
  - Cobertura uniforme dos tecidos pulverizados.
- ➕ É uma formulação líquida de elevado desempenho:
  - Preparação fácil e rápida
  - Mais segura para o aplicador

## OBSERVAÇÕES

- ➕ Os produtos cúpricos, se aplicados com tempo frio e chuvoso, podem provocar fitotoxicidade.
- ➕ Não aplicar em Macieiras e Pereiras após o aparecimento da ponta verde das folhas.
- ➕ Na cultivar “Golden Delicious” aplicar apenas durante o repouso vegetativo.
- ➕ Na Ameixeira, Amendoeira, Cerejeira, Damasqueiro e Pessegueiro não aplicar **CUPRITAL® SC** após a rebentação das árvores. Pode provocar fitotoxicidade.
- ➕ Produto utilizável em Modo de Produção Biológico, de acordo com a legislação. Para qualquer esclarecimento adicional poderá consultar a lista de produtos no site [www.ecocert.com](http://www.ecocert.com), em listas de produtos, procurando pelos nomes comerciais.
- ➕ Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto.
- ➕ Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura.



  
**SAPEC**  
AGRO PORTUGAL

ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

CULTURA	PROBLEMA	CONC. mL/hL	DOSE L/ha	RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO	IS
Ameixeira, Amendoeira, Cerejeira e Pessegueiro	Lepra e crívado	200 - 700	2 - 7	Realizar as aplicações com carácter preventivo. Para mais informações consultar o rótulo do produto.	*
Amendoeira, Cerejeira, Damasqueiro, Ginjeira e Pessegueiro	Moniliose	300	3		
Amendoeira, Cerejeira e Ginjeira	Cancro bacteriano	500	5		
Citrinos	Míldio, alternariose, queimado e pinta negra	200 - 400	2 - 4		7 dias
Damasqueiro	Crívado	200 - 700	2 - 7		*
Macieira e Pereira	Pedrado e moniliose	300 - 400	3 - 4		
	Cancro ou néctria	400	4		
Morangueiro	Mancha encarnada	350	3,5		7 dias
Nespereira	Pedrado	300 - 400	3 - 4		
Oliveira	Gafa, cercosporiose e olho de pavão	300	3		
Tomateiro	Bacteriose	150 - 200	1,5 - 2		
Videira	Míldio	200 - 300	2 - 3		

As concentrações indicadas referem-se a pulverizações em alto volume.

ALARGAMENTO DE ESPECTRO PARA USOS MENORES

CULTURA	PROBLEMA	CONC. mL/hL	DOSE L/ha	RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO	IS
Kiwi	Bacteriose	100 - 175	1 - 1,75	Realizar aplicações com carácter preventivo, no final da colheita, à queda das folhas, após podas de inverno, à rebentação.	7 dias
Macieira e pereira	Fogo Bacteriano	300	3	Tratar até ao aparecimento da ponta verde.	*
		400	4	Tratar preventivamente à queda das folhas.	
Espargo ornamental	Bacteriose	200	2	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas da doença, repetindo se necessário.	-
Manjerição	Míldio	0,1 - 0,16	0,5 - 1,6	Iniciar os tratamentos aos primeiros sintomas e sempre que as condições climáticas sejam favoráveis.	7 dias

\* isento dada a época de aplicação preconizada

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

+ A eficácia e a eventual fitotoxicidade resultantes destas utilizações menores são da inteira responsabilidade do utilizador do produto fitofarmacêutico.



Olho de pavão oliveira



Lepra pessegueiro



Míldio videira