

Enigma[®]

Fungicida sistémico
de amplo espectro



Tipo de produto: Fungicida

Composição: Emulsão água em óleo com
250 g/L ou 25,5% (p/p) de tebuconazol

Família química: Triazol

Número de APV: 3739

Classificação ADR: 3082, 9, III



Embalagem: 40 mL e 1 L



PERIGO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- ⊕ **ENiGMA[®]** é um fungicida orgânico sistémico da família dos triazóis, que atua na demetilação da síntese de esteróis (DMI), com ação preventiva e curativa, indicado para o controlo do oídio da videira, doenças do trigo e cevada e olho de pavão do olival.
- ⊕ O produto penetra rapidamente no interior da folha (2 horas), propiciando a retenção e consequente resistência à lavagem.

OBSERVAÇÕES

- ⊕ Os melhores resultados são obtidos com estratégias preventivas, evitando a entrada da doença e os consequentes estragos.




SAPEC
AGRO PORTUGAL

ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

CULTURA	PROBLEMA	CONC. mL/hL	DOSE L/ha	RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO	IS
Vinha	Oídio	40	0,4	As aplicações devem ser efetuadas a partir dos cachos visíveis. A persistência biológica do produto é de 14 dias. Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha DMI mais de 3 vezes, posicionados antes do fecho dos cachos. Os restantes tratamentos deverão ser realizados com fungicidas com outro modo de ação, como por exemplo BAGO DE OURO® ou STULLN® WG ADVANCE.	14 dias
Trigo	Ferrugem amarela, ferrugem castanha, oídio e septoriose	-	1	As aplicações devem ser feitas após o aparecimento dos primeiros sintomas das doenças, de modo a manter sãs as duas folhas superiores das plantas. Ter em atenção o período que medeia entre o princípio do encanamento e o espigamento, no caso de variedades muito suscetíveis e condições favoráveis ao desenvolvimento das doenças, repetir o tratamento passadas 2 a 3 semanas.	35 dias
Cevada	Ferrugem castanha, helmintosporiose, oídio e rincosporiose	-	1		
Oliveira	Olho de Pavão	60	0,6	Aplicar na Primavera, ao aparecimento da doença e em condições climáticas favoráveis. Repetir se necessário após 2 a 4 semanas, efetuando no máximo 2 tratamentos, com este ou outro DMI. Se necessário, prosseguir os tratamentos no Outono com produtos cúpricos aprovados para a finalidade.	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- + Aconselha-se a aplicação preventiva do produto e a alternância com fungicidas de diferente modo de ação.
- + Em Olival efetuar no máximo 2 tratamentos, com este ou outro DMI.
- + Em Vinha as aplicações realizadas a partir do bago de chumbo deverão dirigir-se especialmente aos cachos para uma melhor proteção.
- + Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto.
- + Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura.



Oídio
vinha



Olho de
pavão
oliveira



Ferrugem
cereais