

Fox® WG Advance



Fungicida sistémico
de amplo espectro

Tipo de produto: Fungicida

Composição: Grânulos dispersíveis em
água com 25 % (p/p) de tebuconazol

Família química: Triazol

Número de APV: 3849

Classificação ADR: 3077, 9, III

Embalagem: 400 g



ATENÇÃO



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- ⊕ **FOX® WG ADVANCE** é um fungicida sistémico de amplo espectro para o controlo do pedrado das pomóideas, da estenfiliose da pereira e do oídio da macieira e da videira.
- ⊕ Apresenta atividade preventiva de 7-8 dias, sendo a sua ação curativa cerca de 3 dias.
- ⊕ Após a aplicação:
 - o produto penetra rapidamente no interior da folha (2 horas), proporcionando resistência à lavagem,
 - a que se segue uma migração lenta e regular no interior da planta - proteção dos novos tecidos.



- ⊕ Pela sua formulação, o **FOX® WG ADVANCE** apresenta:
 - Ausência de pó
 - Elevada homogeneidade das partículas
 - Molha-se e mistura-se rapidamente
 - Não é necessário realizar uma pré-calda
 - Maior segurança para o aplicador
 - Fácil de medir e de limpar
 - Excelente dispersão e suspensão em água
 - Estabilidade em armazém




SAPEC
AGRO PORTUGAL

ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

CULTURA	PROBLEMA	CONC. g/hL	DOSE kg/ha	RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO	IS
Macieira e Pereira	Pedrado	30-40	0,3-0,4	Quando o tempo decorra húmido ou chuvoso realizar os tratamentos ao aparecimento da ponta verde das folhas, ao botão rosa ou botão branco, à queda das pétalas e ao vingamento dos frutos.	21 dias
Macieira	Oídio	40	0,4	Realizar o primeiro tratamento ao abrolhamento.	
Pereira	Estenfiliose	75	0,75	Realizar as aplicações preventivamente desde o vingamento até à colheita, sempre que se verifiquem condições favoráveis ao desenvolvimento da doença.	
Vinha	Oídio	40	0,4	As aplicações devem ser efetuadas a partir dos cachos visíveis, a intervalos máximos de 2 semanas.	14 dias

OBSERVAÇÕES


+ Considerando a prática de uma estratégia mista, determinante em anos de grande heterogeneidade dos pomares, **FOX® WG ADVANCE** é uma ótima solução para utilizar conjuntamente com s.a. de características predominantemente preventivas, como é o caso do mancozebe.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- + Seguir as recomendações dos Serviços de Avisos.
- + Recomenda-se a aplicação de **FOX® WG ADVANCE** em extreme, em mistura ou em alternância com s.a. de características predominantemente preventivas como é o caso de captana, ditianão, mancozebe e tirame, respeitando sempre a dose recomendada.
- + Em macieiras e pereiras, efetuar no máximo 4 aplicações por ciclo vegetativo da planta com soluções do grupo dos IBE's (Inibidores da Biosíntese do Ergosterol).
- + Em vinha realizar um máximo de 3 tratamentos por ciclo cultural, posicionados antes do fecho dos cachos, com este ou outro fungicida do grupo dos IBE's. Os restantes tratamentos devem ser efetuados com STULLN® ou STULLN® WG ADVANCE.
- + Não se deve aplicar **FOX® WG ADVANCE** onde se comecem a verificar quebras de eficácia após aplicações repetidas de IBE's.
- + As concentrações indicadas referem-se a pulverizações em alto volume. Quando a aplicação se faz com aparelhos de médio ou baixo volume (turbinas ou atomizadores), a concentração deve ser aumentada por forma a que a dose de produto por hectare seja a mesma que no alto volume.
- + Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto.
- + Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura.



Pedrado
macieira



Esten-
filiose
pereira



Oídio
videira