

Dicloxan[®]

Herbicida sistémico anti-gramíneas

Tipo de produto: Herbicida

Composição: Concentrado para emulsão com 360 g/L ou 35,1% (p/p) de diclofope-metilo

Contém: xileno

Família química: Ácido 2-(6-arylloxyfenoxi) propiónico

Número de APV: 3043

Classificação ADR: 1307, 3, III



Embalagem: 20 L e 200 L



PERIGO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- ⊕ **DICLOXAN[®]** é um herbicida sistémico com alguma ação de contacto.
- ⊕ O produto é absorvido sobretudo pelas folhas das infestantes, mas essa absorção também se pode dar ao nível das raízes, se o solo apresentar alguma humidade.
- ⊕ **DICLOXAN[®]** é um herbicida de pós-emergência da cultura e das infestantes, que controla as principais infestantes gramíneas dos cereais: balanço, erva-febra e erva-cabecinha.

INFESTANTES SUSCETÍVEIS

Balanço-maior (*Avena sterilis*), erva-cabecinha (*Phalaris minor*) e erva-febra (*Lolium rigidum*).

INFESTANTES RESISTENTES

Dicotilédóneas em geral.




SAPEC
AGRO PORTUGAL

ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

CULTURA	DOSE L/ha	RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO
Beterraba Sacarina e Forrageira	2,5-3,5	Aplicar desde o estado 2-3 folhas da beterraba até 60 dias da colheita.
Cevada	2,5	Aplicar desde o estado de 3 folhas até ao afilhamento.
Trigo Triticale	2,5-3,0	Aplicar desde o estado de 2-3 folhas até ao afilhamento.

OBSERVAÇÕES

- + Principais sintomas das infestantes após a aplicação do produto:
 - Descoloração das folhas
 - Paragem de crescimento
 - Morte do ápice vegetativo
 - Consequente morte de toda a planta
- + Aconselha-se a mistura de **DICLOXAN®** com GRANSTAR® 50 SX para controlar também as infestantes dicotiledóneas e, assim, abranger um maior espectro de ação. (Mistura não homologada: 2-3 L/ha **DICLOXAN®** +20-30 g/ha GRANSTAR® 50 SX).

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- + No caso das infestantes branco-maior (*Avena sterilis*) e erva-febra (*Lolium rigidum*), fazer a aplicação desde a emergência até ao afilhamento.
- + Se a aplicação em erva-febra for realizada antes do início do afilhamento, apenas se deverá utilizar 1,5 a 2,5 L/ha.
- + Para o controlo da erva-cabecinha (*Phalaris minor*) aplicar só até às 4 folhas.
- + O branco-maior é uma infestante de germinações escalonadas, por isso, a aplicação do **DICLOXAN®**, deve ser efetuada numa fase em que se consiga abranger o maior número possível de plantas já nascidas.
- + Devem evitar-se aplicações de **DICLOXAN®** em condições de seca ou em que ocorram temperaturas inferiores a 5°C e superiores a 15°C.
- + São particularmente suscetíveis as seguintes culturas: aveia, milho, sorgo e arroz.
- + É necessário um intervalo de pelo menos 6 horas sem chuva, após a aplicação.
- + Quando se utilizarem herbicidas hormonais as aplicações devem medear 7 dias entre cada produto.
- + Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto.
- + Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura.



Erva-febra



Erva-cabecinha



Branco-maior