

# Vitipec® Combi Azul



Fungicida sistémico para vinha

**Tipo de produto:** Fungicida

**Composição:** Pó molhável com 4,8% (p/p) de cimoxanil + 28% (p/p) de folpete + 4% (p/p) de tebuconazol

**Família química:** Acetamida, N-tiotrihalometilo (ftalamida) e triazol

**Número de APV:** 3998

**Classificação ADR:** 3077, 9, III



**Embalagem:** 250 g



ATENÇÃO

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- + **VITIPEC® COMBI AZUL** é um fungicida sistémico, com atividade preventiva e curativa, que bloqueia a germinação dos esporos e permite o controlo dos primeiros estados de infeção.
- + **VITIPEC® COMBI AZUL** é indicado para combater simultaneamente o míldio e o oídio da videira, nas regiões onde o míldio é a principal doença a combater.
- + É um fungicida composto por 3 s.a.:

### Anti-míldio:

- cimoxanil (Penetrante) - Sistemica localizada que impede o desenvolvimento do fungo antes e após o início da infeção (até metade do período de incubação).
- folpete (Contacto) - Atuação "multi-site" em diversos mecanismos das células, inibindo a germinação dos esporos e o crescimento do micélio; Tem um efeito estimulante sobre a vegetação e ainda ação secundária sobre podridão cinzenta.

### Anti-oídio:

- tebuconazol (Sistémico) - Apresenta uma atividade preventiva de cerca de 7 a 8 dias e uma capacidade curativa de cerca de 3 dias. O produto penetra rapidamente no interior da folha (2 horas), propiciando a retenção e consequente resistência à lavagem. Migra de forma lenta e regular no interior da planta conferindo por isso uma boa proteção dos novos tecidos.



  
**SAPEC**  
AGRO PORTUGAL

## ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

CULTURA	PROBLEMA	CONC. g/hL	DOSE kg/ha	RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO	IS
Vinha (uvas para vinificação)	Míldio e Oídio	250	2,5	Iniciar as aplicações às 7 a 8 folhas, em condições favoráveis às doenças. Os tratamentos seguintes deverão ser realizados quando as condições meteorológicas favorecerem o desenvolvimento das doenças. O intervalo entre tratamentos deverá ser de 10 a 12 dias ou encurtado para 7 a 8 caso as condições sejam de chuva.	42 dias

\* máximo 2 aplicações

## OBSERVAÇÕES

- + Recomendamos a aplicação do **VITIEPEC® COMBI AZUL** com carácter preventivo, de forma a assegurar um bom estado fitossanitário durante o decorrer do ciclo vegetativo.
- + A aplicação do **VITIEPEC® COMBI AZUL** deverá centrar-se preferencialmente até ao fecho dos cachos, dada a grande suscetibilidade da vinha nesta fase a ambas as doenças.

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- + Seguir as recomendações dos Serviços de Avisos
- + O número máximo de tratamentos a efetuar com este ou outro fungicida com o mesmo modo de ação (DMI) deverá ser de 3, posicionados antes do fecho dos cachos, devendo os restantes ser efetuados com outros produtos fitofarmacêuticos como por exemplo Bago de Ouro® 98,5%.
- + A persistência biológica do produto é de 10-12 dias, reduzidos para 7 a 8 dias em condições de chuva
- + Não se deve aplicar nos locais onde se comecem a verificar quebras de eficácia do produto, após aplicações repetidas do mesmo
- + A concentração indicada refere-se a aplicações em alto volume; a dose de emprego em pleno desenvolvimento vegetativo é de 2,5 kg/ha.
- + Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto.
- + Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura.

**Pelo fato de ser um produto com corante, a sua utilização facilita o controlo da qualidade da pulverização e a delimitação das áreas tratadas.**



Míldio



Míldio



Oídio