

# Foxtrot

**Herbicida sistémico e de contacto  
para o controlo de gramíneas em  
trigo, cevada, centeio e tritical**

**Tipo de produto:** Herbicida

**Composição:** Emulsão óleo em água com  
69 g/L ou 6,7% (p/p) de fenoxaprope-P-etilo  
e 34,5 g/L ou 3,35% (p/p) de  
cloquintocete-mexilo ("safener")

Contém nafta de petróleo (petróleo) aromática pesada

**Família química:** Ariloxifenoxipropionato  
e quinolina ("safener")

**Número de AV:** 0535

**Classificação ADR:** 3082, 9, III



**Embalagem:** 1 L e 5 L



**ATENÇÃO**

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- + **FOXTROT** é um herbicida sistémico e de contacto indicado para o controlo de gramíneas em pós-emergência da cultura e das infestantes.
- + A sua absorção é predominantemente foliar, sendo translocado para as raízes e rizomas através do simplasto e do apoplasto.
- + Atua inibindo a biossíntese dos ácidos gordos.

## INFESTANTES SUSCETÍVEIS

Rabo-de-raposa (*Alopecurus myosuroides*), *Avena* spp. e *Phalaris* spp.



## ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

CULTURA	DOSE L/ha	RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO
Trigo, Cevada, Centeio e Triticale	0,8 – 1,2	Aplicar em pós-emergência até ao final do período de afilhamento da cultura (BBCH 12-29), e em pós-emergência das infestantes (desde o estado de 2 folhas até ao início do afilhamento para <i>Phalaris</i> spp. e até ao final do afilhamento para as outras infestantes), quando estas se encontrem em actividade. Realizar no <b>máximo 1 aplicação</b> .

## OBSERVAÇÕES

- + A presença de um “safener” específico garante a total seletividade do produto para as culturas homologadas.
- + Apresenta elevada eficácia para o controlo do Balanco e das diferentes espécies de *Phalaris* (erva cabecinha e alpista).
- + Devido ao tipo de formulação (emulsão de óleo em água), não necessita da adição de molhante para garantia da sua eficácia.

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- + Numa rotação, não apresenta limitações para as culturas seguintes.
- + Flexibilidade na oportunidade de aplicação (grande janela de aplicação).
- + Possibilidade de aplicações precoces, permitindo reduzir, atempadamente, a competição pela água e nutrientes.
- + Não atingir as culturas e terrenos vizinhos. É particularmente sensível a cultura da aveia.
- + Volume de calda indicado: 200-400 L/ha.
- + Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto.
- + Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura.



Balanco-  
-maior



Erva-  
-cabecinha



Erva-  
-febra