

Diquato Sapec

Herbicida de contacto

Tipo de produto: Herbicida

Composição: Solução concentrada com 200 g/L ou 17% (p/p) de diquato (na forma de sal dibrometo)

Família química: Bipiridilo

Número de AV: 0540

Classificação ADR: 3016, 6.1, II

Embalagem: 500 mL, 1 L, 5 L, 20 L



PERIGO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- ➕ **DIQUATO SAPEC** é um herbicida de contacto, não residual.
O produto é indicado para o controlo de infestantes mono e dicotiledóneas nas culturas da vinha e oliveira.
- ➕ **DIQUATO SAPEC** é apenas absorvido pelas partes verdes da planta, pelo que o tronco e os órgãos lenhificados da planta não são afetados.
- ➕ **DIQUATO SAPEC** inativa-se por completo em contacto com o solo.
- ➕ Os sintomas resultantes da aplicação do herbicida nas plantas ocorrem entre 3 a 5 dias após a aplicação.
- ➕ A aplicação de **DIQUATO SAPEC** para dessecação da rama da batateira, facilita a colheita dos tubérculos e diminui a pressão de pragas como a traça da batata.

INFESTANTES SUSCETÍVEIS

Balanço-bravo (*Avena sterilis*), cevada-de-rato (*Hordeum murinum*), erva-febra (*Lolium* spp.), luzernas (*Medicago* spp.), raspa-saías (*Picris echioides*), cabelo-de-cão (*Poa annua*), labças (*Rumex* spp.), mostarda-dos-campos (*Sinapis arvensis*), serralha-macia (*Sonchus oleraceus*), serralhas (*Sonchus* spp.).

INFESTANTES MODERADAMENTE SUSCETÍVEIS

Bromos (*Bromus* spp.), margaças (*Chamaemelum* spp.), margaça-de-inverno (*Chamaemelum fuscum*), maria-fia (*Erodium malacoides*), trevos (*Trifolium* spp.).




SAPEC
AGRO PORTUGAL

ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

CULTURA	DOSE L/ha	RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO	IS
Batata para consumo (dessecação da rama)	3-4	Aplicar quando os tubérculos estiverem completamente desenvolvidos.	4 dias
Batata para semente (dessecação da rama)	5		
Oliveira	4	Aplicar em pós-emergência das infestantes, sem vento e de modo a não atingir as partes verdes das culturas.	-
Vinha			

OBSERVAÇÕES


- + Volume de calda recomendado: 300-400 L/ha para vinha e oliveira e 600-800 L/ha para dessecação da rama da batateira.
- + Se atingir culturas vizinhas das áreas a tratar, o produto pode provocar graves estragos, pelo que não deve ser aplicado quando haja vento. Não afeta os troncos e caules lenhificados.
- + Em batateira, não aplicar quando o terreno estiver muito seco, especialmente quando as folhas apresentem sintomas de murchidão. Depois de um período de seca, só deve aplicar-se três dias após o solo estar bem húmido.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- + A aplicação repetida do mesmo herbicida nas mesmas áreas durante vários anos pode conduzir à ocorrência de resistência em espécies anteriormente suscetíveis. Para evitar o desenvolvimento de resistências recomenda-se proceder, sempre que possível, à utilização de herbicidas com modo de ação diferente do diquato.
- + Em oliveira não aplicar com azeitona caída.
- + Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto.
- + Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura.



Bredos



Milhã digitada



Pampilho das searas