

Spyrit® M

Fungicida anti-míldio com uma importante ação anti-esporulante

Tipo de produto: Fungicida

Composição: Grânulos dispersíveis em água (WG) com 7,5% (p/p) de dimetomorfe e 66,7% (p/p) de mancozebe

Família química: Morfolina e ditiocarbamato

Número de AV: 0829

Classificação ADR: 3088,4.2,II

Embalagem: 250 g e 5 kg



ATENÇÃO

Advertências de perigo: H251, H317, H361d, H410

Recomendações de prudência: P201, P202, P235+P410, P261, P270, P280, P308+P313, P333+P313, P362+P364, P391, P407, P420, P501

Informações suplementares: EUH210, SP1, SPe3, SPPT3

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- ➕ **SPYRIT® M** é um fungicida que contém na sua composição duas substâncias ativas (s.a.): dimetomorfe e mancozebe.
- ➕ **SPYRIT® M** atua através de diferentes processos, bloqueando todas as fases de formação da membrana celular, síntese de proteínas e lípidos e na inibição da produção de energia.
- ➕ Após a aplicação, **SPYRIT® M** reparte-se entre a superfície foliar e o interior da planta, sendo resistente à lavagem uma hora após o tratamento.
- ➕ **SPYRIT® M** com a sua ação preventiva, curativa e anti-esporulante garante uma elevada proteção das culturas.




SAPEC
AGRO PORTUGAL

ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

CULTURA	PROBLEMA	DOSE kg/ha	RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO	IS
Videira (Uva de mesa)	Míldio	2 - 2,5	Efetuar os tratamentos de acordo com as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência, em condições favoráveis à doença, iniciar os tratamentos desde as 8 folhas livres até ao início do fecho dos cachos (BBCH 18-77). Nº máximo de aplicações: 3 aplicações. Intervalo entre aplicações: 10 a 12 dias (Utilizar o intervalo mais curto em condições de elevada pressão da doença) Volume de calda: 300 a 1000 L/ha	28 dias
Videira (Uva para vinificação)	Míldio	2 - 2,5	Efetuar os tratamentos de acordo com as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência, em condições favoráveis à doença, iniciar os tratamentos desde as 8 folhas livres até ao início do fecho dos cachos (BBCH 18-77). Nº máximo de aplicações: 3 aplicações. Intervalo entre aplicações: 10 a 12 dias. Utilizar o intervalo mais curto em condições de elevada pressão da doença. Volume de calda: 300 a 1000 L/ha	66 dias
Batateira	Míldio	2,5	Efetuar os tratamentos de acordo com as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência, realizar os tratamentos sempre que as condições sejam favoráveis ao desenvolvimento da doença (BBCH 12-81). Nº máximo de aplicações: de 3 aplicações. Intervalo entre aplicações: 10 a 12 dias. Volume de calda: 500 a 1000 L/ha	21 dias
Alface (Ar livre)	Míldio	2,5-3,0	Tratar sempre que as condições sejam favoráveis ao desenvolvimento da doença (BBCH 12-47). Nº máximo de aplicações: 2 ou 3 aplicações, não excedendo metade do número total de tratamentos anti-míldio. Intervalo entre aplicações: 10 a 12 dias. Utilizar o intervalo mais curto em condições de elevada pressão da doença. Volume de calda: 500 a 1000 L/ha	28 dias

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- ⊕ Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto.
- ⊕ Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura.



Míldio videira



Míldio batateira



Míldio alface