

# Vydate® 10 G

Nematodocida Sistémico

**Tipo de produto:** Nematodocida  
**Composição:** Grânulos contendo  
100 g/Kg ou 10% (p/p) de oxamil  
**Família química:** Carbamatos  
**Número de AV:** 0301  
**Classificação ADR:** 2757, 6.1, II

# Vydate® 10G



**Embalagem:** 10 kg



PERIGO

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- + Nematodocida sistémico, para aplicação ao solo antes ou durante a sementeira/plantação das culturas.
- + **VYDATE® 10G** atua por contacto e ingestão ao nível do sistema nervoso por inibição da acetilcolinesterase.  
A substância ativa oxamil é rapidamente absorvida e distribuída (de forma ascendente e descendente) pela planta.

## OBSERVAÇÕES

- + A aplicação ao solo, à instalação da cultura, permite controlar os nemátodos e proteger as raízes das plantas desde o início, garantindo o bom desenvolvimento radicular e vegetativo.
- + **VYDATE® 10G** protege a cultura, atuando sobre os nemátodos de três formas distintas: na incubação e eclosão dos ovos, impedindo a sua orientação e movimento para as raízes e posterior penetração nas mesmas.
- + É eficaz no controlo de diversos nemátodos responsáveis por estragos nas principais culturas hortícolas.
- + **VYDATE® 10G** é muito seletivo para as culturas a que se destina.



## ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

CULTURA	PROBLEMA	DOSE kg/ha	RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO	IS
Batateira	Nemátodos do solo ( <i>Heterodera</i> sp. e <i>Globodera</i> sp.)	40-55	Antes ou durante a plantação (aplicação generalizada ao solo)	
Cenoura	Nemátodos do solo ( <i>Meloidogyne</i> sp. e <i>Heterodera carotae</i> )	25	Durante a sementeira (directamente no sulco/linha)	
Tomateiro (sob abrigo)	Nemátodos do solo ( <i>Meloidogyne</i> sp.)	45-55	Antes ou durante a plantação (aplicação generalizada ao solo)	
		30	Durante a plantação (directamente no sulco/linha)	
Pimenteiro (sob abrigo)	Nemátodos do solo ( <i>Meloidogyne</i> sp.)	45-55	Antes ou durante a plantação (aplicação generalizada ao solo)	
		30	Durante a plantação (directamente no sulco/linha)	
Beringela (sob abrigo)	Nemátodos do solo ( <i>Meloidogyne</i> sp.)	45-55	Antes ou durante a plantação (aplicação generalizada ao solo)	
		30	Durante a plantação (directamente no sulco/linha)	
Tabaco	Nemátodos do solo ( <i>Meloidogyne</i> sp. e <i>Meloidogyne incognita</i> )	42,5-55	Antes ou durante a plantação (aplicação generalizada ao solo)	
		30	Durante a plantação (directamente no sulco/linha)	

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- + Imediatamente após a aplicação ao solo, incorporar os grânulos a uma profundidade de 10 cm; não deixar grânulos à superfície.
- + Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto.
- + Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em protecção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura.



Nemá-  
todo



Nemá-  
todo