

Embaixador 224 EC

Inseticida de largo espectro de ação

Tipo de produto: Inseticida

Composição: Concentrado para emulsão (EC)
c/ 22,4% (p/p) ou 224 g/L de clorpirifos-metilo

Família química: Organofosforado

Número de APV: 1032

Classificação ADR: UN 1993; 3; I

Embalagem: 5 L e 20 L



PERIGO

Advertências de perigo: EUH210, H226, H304, H315, H317, H318, H336, H410

Recomendações de prudência: P210, P261, P270, P273, P280, P301+P330+P331, P302+P352, P305+P351+P338, P308+P311, P370+P378, P391, P501a

Informações suplementares: EUH210, SP1, SPe3PT2, SPe3PT2, SPe3PT2, SPe3PT2, SPe8

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- ⊕ **EMBAIXADOR 224 EC** é um inseticida de largo espectro de ação e elevada eficácia
- ⊕ Possui um bom efeito de choque e elevada persistência de ação.
- ⊕ **EMBAIXADOR 224 EC** atua por contacto, ingestão e fumigação. A sua ação de vapor permite-lhe controlar pragas de difícil acesso.

OBSERVAÇÕES

- ⊕ **EMBAIXADOR 224 EC** é um larvicida, pelo que, de um modo geral, deve ser aplicado quando se detetem as formas móveis (larvas) dos insetos.



ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

CULTURA	PRAGA	CONC./ DOSE	RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO	IS
Laranja e Mandarina	Cochonilha-pinta vermelha (<i>Aonidiella aurantii</i>)	300-400 mL/hL (no máximo utilizar a dose de 4,5 L/ha)	Em presença da praga, mas só é permitido o tratamento entre os meses de junho a agosto.	15
	Cochonilha- -algodão (<i>Planococcus citri</i>)	300 mL/hL (no máximo utilizar a dose de 4,5 L/ha)	Em presença da praga realizar o tratamento apenas no mês de agosto.	
	Mosca-do- -Mediterrâneo (<i>Ceratitidis capitata</i>)		Realizar o tratamento em presença da praga desde o início da mudança da cor até à maturação (BBCH 81-83).	
Macieira e Pereira	Bichado-da-fruta (<i>Cydia pomonella</i>)	300 mL/hL (no máximo utilizar a dose de 3 L/ha)	Realizar a aplicação ao aparecimento da praga, durante o desenvolvimento ou a maturação do fruto.	15
Videira	Cigarrinha-verde (<i>Empoasca vitis</i>) e Cicadélídeo-da-flavescência-dourada (<i>Scaphoideus titanus</i>)	0,9 L/ha	Realizar a aplicação ao aparecimento da praga, desde o vingamento até ao pintor (BBCH 71-85).	21
	Traça-dos-cachos (<i>Lobesia botrana</i>)	1,2 L/ha	Realizar a aplicação ao aparecimento da praga, desde as inflorescências completamente desenvolvidas até ao início do pintor (BBCH 57-83).	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- ⊕ Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.
- ⊕ Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície.
- ⊕ Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.
- ⊕ Sempre que possível, utilizar bicos anti-deriva.
- ⊕ Não aplicar este produto na presença de infestantes em floração.
- ⊕ Não entrar nas culturas tratadas até à secagem completa do pulverizado.
- ⊕ Nos citrinos a época de aplicação do produto, está restringida apenas aos meses de Junho a Agosto.
- ⊕ Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto.
- ⊕ Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura.



Cochonilhas



Bichado da fruta



Traça da uva