

Equador[®]

Fungicida sistêmico
de amplo espectro

Tipo de produto: Fungicida

Composição: Grânulos dispersíveis em água
(WG) com 50% (p/p) de ciprodinil

Família química: Anilino pirimidinas

Número de APV: 1063

Classificação ADR: UN3077; 9; III

Embalagem: 500 g



ATENÇÃO

Advertências de perigo: H410

Recomendações de prudência: P103, P270, P280, P312, P501

Informações suplementares: EUH210, EUH208, SP1, SPe3, SPo2, SPoPT2, SPoPT4, SPoPT5, SPoPT6

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- ⊕ Eficaz a baixas temperaturas
- ⊕ Excelente solução para os estados fenológicos iniciais das pomóideas
- ⊕ Elevada resistência à lavagem após 2 horas de secagem da pulverização
- ⊕ Ideal para estratégias anti-resistência pedrado, alternando com produtos de outras famílias
- ⊕ Completa proteção da planta através de distribuição translaminar e sistemica acrópeta no xilema



ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

CULTURA	PROBLEMA	CONC./DOSE	RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO	IS
Macieira e Pereira	Pedrado (<i>Venturia inaequalis</i> ; <i>Venturia pyrina</i>)	50 g/hL (máximo 0,5 kg/ha)	<p>Iniciar as aplicações de acordo com as indicações do Serviço de Avisos. Na sua ausência fazer a 1ª aplicação ao aparecimento da ponta verde, repetir no estado de botão branco ou rosa e prosseguir até ao final da floração.</p> <p>A persistência biológica é de 7 a 10 dias. Não efectuar mais do que 3 tratamentos por campanha com este produto ou outro do grupo das anilino pirimidinas.</p>	60 dias
Videira	Podridão cinzenta dos cachos (<i>Botrytis cinerea</i>)	75 g/hL (máximo 0,75 kg/ha)	<p>As épocas fundamentais de tratamento são a floração-alimpa e o pintor. Em anos e/ou condições muito favoráveis poderão efectuar-se aplicações fungicidas ao fecho dos cachos e 3-4 semanas antes da colheita.</p> <p>Não efectuar mais do que 1 tratamento por campanha com este produto ou outro do grupo das anilino pirimidinas</p>	<p>7 uvas de mesa</p> <p>14 uvas para vinificação</p>

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- + Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.
- + Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície.
- + Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.
- + Sempre que possível, utilizar bicos anti-deriva.
- + Não entrar nas culturas tratadas até à secagem completa do pulverizado.
- + Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto.
- + Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em protecção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura.

Edição: F-EQU-12/77CLP(FT) - Leia sempre o rótulo da embalagem, siga as instruções de uso e esteja atento às frases e símbolos constantes do mesmo.



**Pedrado
macieira**



**Pedrado
pereira**



**Podridão
cinzenta**