

# Mesopec® 100 SC

Herbicida sistêmico  
de pós-emergência

**Tipo de produto:** Herbicida

**Composição:** Suspensão concentrada com  
100 g/L ou 9,22% (p/p) de mesotriona

**Família química:** Ciclohexanodiona

**Número de AV:** 0986

**Classificação ADR:** 3082, 9, III

**Embalagem:** 1 L, 5 L e 20 L



PERIGO

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- ➕ **MESOPEC® 100 SC** é um herbicida sistêmico, aplicado em pós-emergência.
- ➕ O produto é absorvido via foliar mas também pode ser através das raízes, com translocação ascendente e descendente, sendo distribuído por toda a planta.
- ➕ **MESOPEC® 100 SC** está indicado para o controlo de infestantes anuais gramíneas, dicotiledóneas e junça em Milho.

## INFESTANTES SUSCETÍVEIS

Bredo (*Amaranthus hybridus*), moncos-de-perú (*Amaranthus retroflexus*), malvão (*Abutilon theophrasti*), Bidens tripartita, catassol (*Chenopodium album*), erva-das-sementes (*Chenopodium polyspermum*), figueira-do-inferno (*Datura stramonium*), milhã-digitada (*Digitaria sanguinalis*), milhã-pé-de-galo (*Echinochloa crus-galli*), erva-da-moda (*Galinsoga parviflora*), *Panicum dichotomiflorum*, persicária (*Persicaria maculosa*), *Polygonum persicarioides*, erva-moira (*Solanum nigrum*), serralhinha (*Sonchus oleraceus*), morugem-branca (*Stellaria media*), bardana-menor (*Xanthium strumarium*) e junça (*Cyperus rotundus*).

## INFESTANTES RESISTENTES

Beldroega (*Portulaca oleracea*), Setárias (*Setaria* spp.).



  
**SAPEC**  
AGRO PORTUGAL

## ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO


CULTURA	INIMIGO	DOSE	ÉPOCA E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO	IS
<b>MILHO</b> (Grão e forragem)	Infestantes dicotiledóneas	0,75-1,5 L/ha	Aplicação em pós-emergência do milho, das duas às nove folhas desdobradas (BBCH 12-19), quando as infestantes tiverem duas a quatro folhas (jovens).	-
	Infestantes gramíneas anuais	1-1,5 L/ha		-
	Junça ( <i>Cyperus rotundus</i> )	1,5 L/ha		-

## OBSERVAÇÕES

- + As infestantes sensíveis ao **MESOPÉC® 100 SC** exibem um característico esbranquiçamento geral antes de morrerem.
- + Volume de calda a utilizar: 200-400 L/ha.

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- + Não aplicar quando temperaturas < 10°C.
- + É recomendado alternar o uso de herbicidas com diferentes modos de ação.
- + Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto.
- + Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura.



Junça



Milhã-pé-de-galo



Junça