

ETYLIT® Premier

Fungicida sistémico de largo espectro



Tipo de produto: Fungicida

Composição: Pó molhável (WP) com 74,6% (p/p) de fosetil (na forma de sal de alumínio) correspondendo a 80% (p/p) de fosetil-Al

Família química: Organometálico com alumínio

Número de AV: 0613

Classificação ADR: Isento



Embalagem: 1 kg e 5 kg

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- + Exerce a sua ação por duas vias:
 - direta** - ao inibir o desenvolvimento do fungo e a formação dos esporos;
 - indireta** - ao estimular as defesas naturais das plantas.
- + Assegura uma proteção preventiva de longa duração e está igualmente dotado de uma ação curativa de 2-3 dias após o início da infeção.

OBSERVAÇÕES

- + **ETYLIT® Premier** apresenta atividade contra outros fungos: *Alternaria spp.* e *Fusarium spp.*.
- + Para além da sua atividade fungicida, também manifesta atividade contra bacterioses produzidas por *Xanthomonas spp.*, *Erwinia spp.* e *Pseudomonas spp.*.
- + Seguir as recomendações dos serviços de Avisos.
- + O **ETYLIT® Premier** não deverá ser misturado com adubos foliares (particularmente se apresentarem na sua composição azoto amoniacal) e produtos à base de óleo mineral e cobre.



ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

CULTURA	PROBLEMA	CONC. g/hL	DOSE kg/ha	RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO	IS
Citrínos	Gomose	250	2,5	Aplicar na fase de crescimento ativo da árvore e logo que surjam os primeiros sintomas de gomose, de 3 em 3 meses por via foliar. Em casos graves as aplicações devem ser feitas de 2 em 2 meses.	15 dias
	Míldio			Aplicar de novembro até fevereiro desde que o tempo decorra frio e chuvoso, caso necessário repetir a aplicação com intervalos de 1 mês.	
Macieira Pereira	Cancro Podridão	250	2,5	Aplicar o produto no pomar 3 semanas e poucos dias antes da colheita.	3 dias

ALARGAMENTO DE ESPECTRO PARA USOS MENORES

CULTURA	PROBLEMA	CONC. g/hL	DOSE kg/ha	RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO	IS
Macieira e Pereira	Fogo bacteriano (Erwinia amylovora)	375	3,75	Pulverizar desde o início da floração e repetir três a quatro dias depois. Um terceiro tratamento três a quatro dias depois do segundo se os riscos de contaminação forem importantes, ou, se a floração se prolongar.	21 dias

As concentrações indicadas referem-se a pulverizações em alto volume.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- + A eficácia e a eventual fitotoxicidade resultantes desta utilização menor são da inteira responsabilidade do utilizador do produto fitofarmacêutico.
- + Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto.
- + Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura.



Cancro macieira



Gomose dos citrínos



Fogo Bacteriano das Pomóideas