

# Fitanol® Sapec

Inseticida e acaricida de contacto

**Tipo de produto:** Inseticida

**Composição:** Concentrado para emulsão (EC) com 96,9% (p/p) ou 790 g/L de óleo parafínico

**Família química:** Hidrocarboneto

**Número de AV:** 0834

**Classificação ADR:** Isento

**Embalagem:** 20 L e 200 L



PERIGO

**Advertências de perigo:** H304

**Recomendações de prudência:** P270, P301+P310, P331, P405, P501

**Informações suplementares:** EUH210, SP1, SPe8, SPPT1, SPPT2, SPPT4

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- + **FITANOL® SAPEC** é um inseticida que atua por contacto recomendado para o controlo de ácaros e cochonilhas dos citrinos e de formas hibernantes de insetos e ácaros em diversas culturas.
- + **FITANOL® SAPEC** forma uma película sobre o inimigo, causando a sua morte por asfixia.

## OBSERVAÇÕES

- + Não deve ser misturado com ditianão, captana, folpete, enxofre, tirame e zirame. Cumprir um intervalo mínimo de 15 dias entre a aplicação de Fitanol® Sapec e estas substâncias.
- + Nos tratamentos de verão evitar aplicar nos períodos de maior calor.




  
**SAPEC**  
AGRO PORTUGAL

ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

CULTURA	PRAGA	CONC. L/hL	RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO	IS
Citrinos	Cochonilhas	1-2 (Máx. 40 L/ha)	Aplicar no momento em que se verifique o máximo da eclosão das ninfas. Não aplicar desde a floração até os frutos atingirem o tamanho de uma noz. Não deve ser aplicado em plantas com sede. Aconselha-se uma rega na véspera.	
Macieira, Pereira, Pessegueiro, Ameixeira, Cerejeira e Damasqueiro	Formas hibernantes de insetos e ácaros	1,75 – 2,5 L/hL (Máx. 37,5 L/ha)	Aplicar no repouso vegetativo até aos estados B-C (Entumescimento dos gomos), pulverizando de forma a que os ramos e troncos sejam uniformemente atingidos pela calda. Utilizar a concentração mais elevada para níveis de infestação superiores.	
	Aranhinho-vermelho e Aranhão amarelo	1-2L (Máx. 30 L/ha)	Na presença da praga, tratar desde o fim da floração até ao amadurecimento dos frutos.	
Videira	Formas hibernantes de insetos e ácaros	1,75-2,5 L/hL (Máx. 15 L/ha)	Aplicar no repouso vegetativo, preferencialmente desde o entumescimento dos gomos até ao aparecimento da primeira folha, pulverizando de forma a que os ramos e troncos sejam uniformemente atingidos pela calda. Utilizar a concentração mais elevada para níveis de infestação superiores.	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- + Pode apresentar alguns sintomas de fitotoxidade nas variedades de macieira do grupo “Golden Delicious” nas aplicações efetuadas no verão.
- + Nos tratamentos de inverno utilizar a pulverização a alto volume e alta pressão molhando bem toda a planta.
- + Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto.
- + Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF’s recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura.



Ovos de inverno de ácaro



Adulto de ácaro



Cochonilhas