

Fungicida

Melvar®

Fungicida sistêmico de amplo espectro

Tipo de produto: Fungicida

Composição: Concentrado para emulsão (EC) com 250 g/L ou 25,0% (p/p) de protriocanazol

Família química: Triazol

Número de AV: 1668

Classificação ADR: 3082, 9, III

Embalagem: 5 L



ATENÇÃO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- MELVAR® é um fungicida sistêmico, com atividade preventiva, curativa e erradicante
- MELVAR® penetra no interior das folhas proporcionando resistência à lavagem, distribuindo-se no interior da planta, possibilitando a proteção dos novos tecidos

OBSERVAÇÕES

- Fazer, no máximo, duas aplicações com MELVAR® por campanha agrícola para todas as culturas e finalidades, com um intervalo entre aplicações de 10 a 14 dias.

ASCENZA®

CULTURA	DOENÇA	DOSE (L/ha)	ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO	IS
TRIGO MOLE TRIGO DURO	Ferrugem (<i>Puccinia</i> sp.)	0,8	O MELVAR® destina-se a ser aplicado preventivamente, devendo fazer-se uma primeira aplicação ao encanamento, desde a fase do 1º nó estar pelo menos 1 cm acima do nó de afilhamento e a fase do 3º nó estar pelo menos 2 cm acima do 2º nó (BBCH 31-33). A segunda aplicação deverá ser efetuada desde a fase em que a folha bandeira está completamente aberta (apenas ligula visível) até ao final do emborramento, com a ponta da espiga visível (BBCH 39-49).	35
	Fusariose (<i>Fusarium</i> sp.)	0,8	O MELVAR® destina-se a ser aplicado preventivamente, devendo fazer-se uma primeira aplicação desde a fase em que a folha bandeira está completamente aberta (apenas ligula visível) até a meio da fase de emborramento, com a bainha da folha bandeira apenas visivelmente inchada (BBCH 39-43). A segunda aplicação deverá ser efetuada desde a fase em que a espiga está 30% emergida até à fase da plena floração, com 50% das anteras maduras (BBCH 53-65).	
CEVADA HEXÁSTICA CEVADA DÍSTICA	Fusariose (<i>Fusarium</i> sp.)			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Seguir as recomendações do Serviços de Avisos
- Calibrar adequadamente o equipamento de aplicação. A concentração de produto deve ser ajustada à quantidade de água distribuída por hectare, pelo pulverizador, de modo a não exceder as doses indicadas. Para diminuir o risco de arrastamento de calda, evitar pressões superiores a 2 kg/cm² e o uso de atomizadores. Aplicar em condições de pouco vento
- Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto
- Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura



Trigo / ferrugem/fusariose



Cevada / fusariose

